

MALATTIA	RESTRIZIONI ALLA FREQUENZA DI COMUNITÀ INFANTILI PER MOTIVI DI CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI
Congiuntivite purulenta	24 ore dopo l'inizio del trattamento
Diarrea/Vomito	24 ore dopo la cessazione della diarrea/vomito
Esantema febbrile	Variabile in dipendenza della malattia diagnosticata
Faringite streptococcica	48 ore dall'inizio della terapia
Impetigine	24 ore dall'inizio della terapia
Epatite A	7 giorni dalla comparsa dell'ittero
Morbillo	5 giorni dalla comparsa dell'esantema
Parotite	9 giorni dalla comparsa della tumefazione delle ghiandole salivari
Pertosse	5 giorni completi di terapia antibiotica (che deve essere data per 14 giorni)
Rosolia	7 giorni dall'esordio dell'esantema
Scarlattina	48 ore dall'inizio della terapia
Varicella	Fino al completo essiccamento di tutte le vescicole (fase crostosa)
Dermatofitosi	Dopo l'inizio del trattamento (in caso di tinea corporis, cruris e pedis: esclusione della frequenza di palestre e piscine per tutto il periodo di trattamento)
Pediculosi	Fino al giorno successivo al primo trattamento
Scabbia	Fino al giorno successivo all'inizio della terapia
Sindrome mano bocca piede	Fino a guarigione clinica
Stomatite	Fino a guarigione clinica
Sesta malattia	Nessuno
Quinta malattia	Nessuno
Influenza	Fino a guarigione clinica
Ossiuriasi	Fino al giorno successivo all'effettuazione della terapia
Mononucleosi	Nessuno
Citomegalovirus	Nessuno
Mollusco contagioso	Nessuno (coprire le lesioni)